

平廷實業有限公司 函

公司地址：高雄市左營區榮總路 105 號 8 樓
承辦人：黃慧玲
電話：07-3458787 # 28
傳真：07-3598099

受文者：臺中榮民總醫院嘉義分院

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

發文日期：中華民國 109 年 11 月 06 日

發文字號：平字第 1091106005 號

附件：健喬信元公文(含新舊外盒.仿單照片)

主旨：有關本公司經銷藥品-骨多能膠囊 250 毫克 Kudona Capsules 250mg；
Glucosamine Sulafate 250mg/Cap. (衛署藥製字第 042350 號)-變更包裝通
知，請查照。

說明：

- 一、本公司經銷之藥品衛署藥製字第 042350 號：骨多能膠囊 250 毫克 (Kudona Capsules 250mg；Glucosamine Sulafate 250mg/Cap.)，承蒙 貴院採用在列，不勝感激。
- 二、由於配合 TFDA 對 OTC 產品的包裝規定。因改變外盒(瓶子)標籤及仿單編排格式。新舊照片詳如附件。
- 三、上述藥品變更新包裝起始批號:SK547。並於民國 109 年 11 月初起陸續供應新包裝。
- 四、承蒙 貴院長久以來的支持與愛護，若有造成不便，敬請見諒。

正本：臺中榮民總醫院嘉義分院

副本：

平廷實業有限公司

負責人：李 蜀 平

檔 號：
保存年限：

健喬信元醫藥生技股份有限公司 函

地址：114 台北市內湖區內湖路一段 396 號 11 樓
聯絡人：游子賢
電話：02-87977100 分機 804
傳真：02-87972746

受文者地址：

受文者：各醫療院所

發文日期：中華民國 109 年 11 月 4 日
發文字號：健總字第 10911010 號
速別：普通
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：


主旨：本公司之藥品一骨多能膠囊 250 毫克(Kudona Capsules 250mg; Gulcosamine Sulfate 250mg/ Cap.) 變更包裝通知，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、本公司之藥品衛署藥製字第 042350 號：骨多能膠囊 250 毫克(Kudona Capsules 250mg; Gulcosamine Sulfate 250mg/ Cap.)，承蒙 貴院採用在列，不勝感激。
- 二、由於配合 TFDA 對 OTC 產品的包裝規定。因此改變外盒(瓶子)標籤及仿單編排格式。詳見附件新舊對照。
- 三、新包裝起始批號: SK547。並於民國 109 年 11 月初起陸續供應新包裝。
- 四、今日特此通知，懇請 貴院能予以考量本公司相關成本之調升，惠予同意為荷，無任感禱!

正本：
副本：





健喬信元醫藥生技股份有限公司



董事長 林智暉



附件

<p>包裝</p>	<p style="text-align: center;">外盒標籤 (批號 SK547 起)</p>
<p>新舊支盒</p>	<p style="text-align: center;">骨多能 Kudona 250mg 支盒 新舊包裝對照</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>新包裝</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>舊包裝</p>  </div> </div>
<p>新仿單</p>	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>

裝 訂 線

骨多能 膠囊 250 毫克
Kudona Capsules 250 mg

【成分】每粒膠囊中含有
Crystalline D-Glucosamine Sulfate..... 314 mg
(eq. to D-Glucosamine Sulfate 250 mg and Sodium Chond 64 mg)

【適應症】
緩解退行性關節炎之疼痛。

【用法、用量】

1. 輕微至中等程度之關節症狀，每天兩次，每次 2 粒膠囊，連續治療 6 星期。
 2. 嚴重症狀之關節炎。
 - (1) 短期治療：
服用治療 8 星期，從下午開始服用，每天三次，每次 2 粒膠囊，從此繼續治療至少 8 星期，飯前 15 分鐘服用。
 - (2) 長期治療：
繼續治療 3 ~ 4 個月，維持劑量為每天兩次，每次 2 粒膠囊，飯前 15 分鐘服用。
- 請參閱說明書之劑量表。

【禁忌】

由於缺乏資料數據，在此風險下，不可使用於懷孕期和哺乳期間。

【交互作用】

1. Tetracycline，會增加 Tetracycline 血中濃度。
2. Penicillin V 及 Chloramphenicol，會降低吸收。

【儲存條件】

儲存於 25°C。

【賦形劑】

Corn Starch, Lactose Monohydrate, Talc, Magnesium Stearate, Capsule(Gelatin, Glycerol, Sodium Laureth Sulfate, New Cocoon, Tartazine, Brilliant Blue FCF, Titanium Dioxide)

【包裝】

8 ~ 1000 粒，塑膠瓶裝，附函盒裝。

衛署藥製字第 G-0334 號
042350 號

委託者：健喬信元製藥科技股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉光復北路 21 巷 4 號

製造廠：健尚化學製藥股份有限公司

304 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

SLT0215R-02